

<https://healthyungthu.com/shop/>

Ponatinib (Iclusig)

Về loại thuốc này

Ponatinib được sử dụng để điều trị ung thư. Nó được dùng bằng đường uống (bằng miệng).

Tác dụng phụ có thể xảy ra

- Ức chế tủy xương. Đây là tình trạng giảm số lượng bạch cầu, hồng cầu, và tiểu cầu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến bạn mệt mỏi, yếu đuối và tăng nguy cơ chảy máu.
- Buồn nôn
- Đau bụng • Táo bón
(không thể đi tiêu) • Mệt mỏi

- Sốt
- Sưng tay, chân hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể •

Chảy máu bất thường - các triệu chứng có thể là ho ra máu, nôn ra máu (có thể trông giống bã cà phê), đi tiêu phân màu đỏ hoặc đen như hắc ín, kinh nguyệt ra nhiều bất thường, chảy máu cam, hoặc bất kỳ chảy máu bất thường nào

khác. • Đau khớp •

Nhức đầu

- Phát ban
- Da khô •

Thay đổi chức năng tuyến tụy và gan • Huyết áp

cao

Lưu ý: Mỗi tác dụng phụ nêu trên được báo cáo ở hơn 20% bệnh nhân được điều trị bằng ponatinib.

Tất cả các tác dụng phụ có thể không được bao gồm. Tác dụng phụ của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào chẩn đoán, tình trạng ung thư của bạn hoặc nếu bạn đang dùng kết hợp các loại thuốc khác. Vui lòng thảo luận bất kỳ mối quan ngại hoặc thắc mắc nào với đội ngũ y tế của bạn.

Cảnh báo và đề phòng



<https://healthyungthu.com/shop/>

- Úc chế tủy xương nghiêm trọng • Mờ

mắt hoặc những thay đổi khác về thị lực bao gồm mất thị lực • Thay đổi chức

năng tim của bạn như nhịp tim bất thường và suy tim sung huyết - tim bạn không bơm máu tốt như bình thường và chất lỏng có thể tích tụ trong cơ thể bạn. Những thay đổi này có thể đe dọa tính mạng.

- Chảy máu bất thường nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng •

Cục máu đông và các biến cố như đột quỵ và đau tim có thể đe dọa tính mạng. Cục máu đông ở chân có thể khiến chân bạn sưng lên, đỏ và ấm và/hoặc gây đau. Cục máu đông trong phổi có thể gây khó thở, đau khi thở và/hoặc đau ngực.

- Sưng trong não thường có thể hồi phục được. Các triệu chứng có thể xảy ra đột ngột (cấp tính) và có thể bao gồm đau đầu, lú lẫn, thay đổi thị lực, cực kỳ mệt mỏi/hôn mê và/hoặc co giật. Nếu bạn bắt đầu có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy cho bác sĩ biết ngay.

- Huyết áp cao nghiêm trọng •

Viêm tuyến tụy nghiêm trọng • Thay đổi

nghiêm trọng trong chức năng gan, có thể gây suy gan và đe dọa tính mạng. • Hội chứng ly giải khối u:

Thuốc này có thể tác động lên tế bào ung thư rất nhanh. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn thận hoạt động.

- Sưng chân, mắt cá chân và/hoặc bàn chân nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng. Bạn có thể có khó thở do chất lỏng tích tụ xung quanh phổi và/hoặc tim của bạn.
- Ảnh hưởng lên dây thần kinh được gọi là bệnh thần kinh ngoại biên. Bạn có thể cảm thấy tê, ngứa ran hoặc đau ở tay và chân. Bạn có thể khó cài nút quần áo, mở lọ hoặc đi lại như bình thường. Tác dụng lên dây thần kinh có thể trở nên tồi tệ hơn khi dùng nhiều liều thuốc hơn. Những tác dụng này sẽ thuyên giảm ở một số người sau khi ngừng dùng thuốc nhưng không thuyên giảm ở tất cả mọi người.
- Vết thương chậm lành và thủng, là một lỗ bất thường trong dạ dày, ruột, thực quản hoặc cơ quan khác, có thể đe dọa tính mạng.

Lưu ý: Một số tác dụng phụ nêu trên rất hiếm gặp. Nếu bạn có mối quan ngại và/hoặc thắc mắc, vui lòng thảo luận với đội ngũ y tế của bạn.

Thông tin quan trọng

- Ponatinib có thể khiến vết thương chậm lành. Không nên dùng thuốc này trong vòng 1 tuần kể từ khi phẫu thuật theo kế hoạch và trong ít nhất 2 tuần và cho đến khi vết thương lành hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật lớn. Nếu bạn phải phẫu thuật khẩn cấp hoặc gặp tai nạn dẫn đến vết thương, hãy nói với bác sĩ rằng bạn đang dùng ponatinib.

Cách dùng thuốc của bạn

- Nuốt toàn bộ thuốc cùng hoặc không cùng thức ăn. Không nghiền nát, bẻ, cắt hoặc nhai viên thuốc.
- Quên liều: Nếu bạn quên một liều, hãy dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường và liên hệ với bác sĩ của bạn. Không dùng 2 liều cùng lúc và không tăng gấp đôi liều tiếp theo. • Xử lý: Rửa

tay sau khi xử lý thuốc, người chăm sóc bạn không nên xử lý thuốc của bạn.

uống thuốc bằng tay trần và phải đeo găng tay cao su.



<https://healthyungthu.com/shop/>

• Thuốc này có thể có trong nước bọt, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, phân, chất nôn mửa, tinh dịch và âm đạo dịch tiết. Nói chuyện với bác sĩ và/hoặc y tá của bạn về các biện pháp phòng ngừa cần thiết cần thực hiện trong thời gian này.

• Bảo quản: Bảo quản thuốc này trong bao bì gốc ở nhiệt độ phòng. • Vứt bỏ thuốc không sử dụng: Không

xả thuốc hết hạn và/hoặc thuốc chưa sử dụng vào bồn cầu

hoặc dẫn lưu u trừ khi bạn đư ợc hư ớng dẫn cụ thể làm như vậy trên nhãn thuốc. Một số cơ sở có chư ớng trình thu hồi và/hoặc các lựa chọn khác. Nếu bạn không có chư ớng trình thu hồi thuốc tại khu vực của mình, vui lòng thảo luận với y tá hoặc bác sĩ của bạn về cách vứt bỏ thuốc không sử dụng.

Điều trị tác dụng phụ

• Uống nhiều nước (nên uống tối thiểu tám ly mỗi ngày). • Nếu nôn, bạn nên uống nhiều

nước hơn để không bị mất nước (thiếu nước

cơ thể khỏi bị mất quá nhiều chất lỏng).

• Để giảm buồn nôn và ói mửa, hãy ăn nhiều bữa nhỏ và thư ớng xuyên thay vì ba bữa lớn mỗi ngày.

Chọn thực phẩm và đồ uống ở nhiệt độ phòng. Hãy hỏi y tá hoặc bác sĩ của bạn về những lời khuyên hữu ích khác và loại thuốc hiện có để giúp ngăn chặn hoặc giảm bớt những triệu chứng này.

• Nếu bạn không thể đi đại tiện, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá trư ớc khi sử dụng dụng cụ thụt, thuốc nhuận tràng hoặc thuốc đạn.

• Hãy hỏi y tá hoặc bác sĩ của bạn về các loại thuốc hiện có để giúp giảm bớt hoặc ngăn chặn tình trạng khó chịu của bạn. táo bón.

• Kiểm soát đư ợc cơn đau là điều quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn biết nếu bạn đang trải qua nỗi đau. • Dư ớng

ấm cho da nhiều lần trong ngày. • Tránh tiếp xúc với ánh

nắng mặt trời và thoa kem chống nắng thư ớng xuyên khi ra ngoài trời. • Nếu bạn bị phát ban

thì đư ờng bôi bất cứ thứ gì lên đó trư ớc khi bác sĩ hoặc y tá bảo bạn có thể. Giữ khu vực

xung quanh vết phát ban sạch sẽ và khô ráo. Hãy hỏi bác sĩ về thuốc nếu phát ban làm bạn khó chịu.

• Nếu bạn bị tê và ngứa ran ở tay và chân, hãy cẩn thận khi nấu ăn, đi lại và xử lý các vật sắc nhọn và chất lỏng nóng.

• Kiểm soát sự mệt mỏi bằng cách điều chỉnh nhịp độ hoạt động

trong ngày. • Đảm bảo có thời gian nghỉ ngơi giữa các hoạt động tiêu hao năng

lượng. • Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, hãy rửa tay thư ớng xuyên. • Tránh

tiếp xúc gần với những ngư ời bị cảm lạnh, cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. • Đo nhiệt

độ theo yêu cầu của bác sĩ hoặc y tá và bất cứ khi nào bạn cảm thấy có thể một cơn sốt.

• Để giảm nguy cơ chảy máu, hãy sử dụng bàn chải đánh răng mềm. Kiểm tra với y tá của bạn trư ớc khi sử dụng nha khoa xia răng.

• Phải hết sức cẩn thận khi sử dụng dao hoặc dụng

cụ. • Dùng máy cạo râu điện thay cho dao cạo.

Tư ớng tác thực phẩm và thuốc

• Tránh dùng bư ời hoặc nước ép bư ời khi dùng thuốc này vì nó có thể làm tăng nồng độ ponatinib

trong cơ thể bạn, điều này có thể làm cho tác dụng phụ trở nên tồi tệ hơn.



<https://healthyungthu.com/shop/>

- Thuốc này có chứa lactose. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn không dung nạp lactose.
- Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn và thực phẩm bổ sung (vitamin, khoáng chất, thảo dược và các loại khác) mà bạn đang dùng trước khi bắt đầu dùng thuốc này vì đã biết có những tương tác thuốc với ponatinib. Ngoài ra, hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi bắt đầu bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn mới hoặc thực phẩm bổ sung nào để đảm bảo rằng không có tương tác.
- Thuốc này có thể tương tác với St. John's Wort và có thể làm giảm nồng độ thuốc trong cơ thể bạn, có thể làm cho nó kém hiệu quả hơn.

Khi nào cần gọi bác sĩ

Gọi cho bác sĩ hoặc y tá nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây và/hoặc bất kỳ triệu chứng mới hoặc bất thường nào:

- Sốt từ 100,4° F (38° C) trở lên
- Ớn lạnh
- Cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng
- Nhức đầu không thuyên giảm
- Lú lẫn
- Cực kỳ mệt mỏi và/hoặc hôn mê
- Các triệu chứng của cơn động kinh như lú lẫn, ngất xỉu, bất tỉnh, mất thính giác hoặc thị lực, mờ mắt, mũi hoặc vị bất thường (chẳng hạn như cao su cháy), khó nói, run hoặc run ở một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể, cử động cơ thể lặp đi lặp lại, cơ bắp căng thẳng không thư giãn và mất kiểm soát nước tiểu và ruột. Nếu bạn hoặc thành viên gia đình nghi ngờ bạn đang lên cơn động kinh, hãy gọi 911 ngay.
- Nhìn mờ, thay đổi thị lực hoặc đau mắt
- Tê, ngứa ran hoặc đau ở tay và chân
- Đau ở ngực hoặc

bụng không biến mất • Đau dữ dội ở bụng có thể lan ra lưng • Thở khó

khè và/hoặc khó thở • Cảm giác tim bạn đập nhanh hoặc không bình

thường (đánh trống ngực) • Chân bạn sưng, đỏ, ấm và/hoặc đau • Đau ngực

hoặc có triệu chứng của cơn đau tim. Hầu hết các cơn đau tim đều liên quan đến

cơn đau ở giữa ngực kéo dài hơn một vài phút.

Cơn đau có thể biến mất và quay trở lại. Nó có thể cảm thấy như bị áp lực, bị ép, đầy hoặc đau.

Đôi khi cảm thấy đau ở một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ,

hàm hoặc dạ dày. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này kéo dài 2 phút, hãy gọi 911.

- Các triệu chứng của đột quỵ như tê hoặc yếu đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân, hầu hết ở một bên cơ thể; nhầm lẫn đột ngột, khó nói hoặc khó hiểu; khó nhìn đột ngột ở một hoặc cả hai mắt; đột ngột khó đi lại, cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng hoặc phối hợp; hoặc đau đầu đột ngột, dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này trong 2

phút, hãy gọi 911.

- Mệt mỏi ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bạn

Buồn nôn khiến bạn không ăn uống được và/hoặc dùng thuốc theo toa không thuyên giảm

• Nôn nhiều hơn 3 lần một ngày

• Không đi đại tiện trong 3 ngày hoặc khi bạn cảm thấy khó chịu



<https://healthyngthu.com/shop/>

- Khó nuốt • Dấu hiệu

có thể có vấn đề về gan: nư ớc tiểu s ẫm màu, phân nh ạt màu, đau bụng, cảm gi ác

Rất mệt mỏi và yếu đuối, ngứa bất thư ờng hoặc vàng mắt hoặc da

- Dấu hiệu tiêu hủy khối u: nhầm lẫn hoặc kích động, giảm lưu ợng nư ớc tiểu, buồn nôn/nôn, tiêu chảy, chuột rút cơ, tê và/hoặc ngứa ran, co giật •

Sử ng tay, chân hoặc bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể •

Tăng cân 5 pound trong một tuần (giữ nư ớc) • Dấu hiệu

chảy máu bất thư ờng như ho ra máu, nôn ra máu (có thể trông giống như bã cà phê), dễ chảy máu hoặc

bầm tím, đi tiêu phân màu đỏ hoặc đen như nhựa đ ờng, kinh nguyệt ra nhiều bất thư ờng, chảy

máu cam hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác. chảy máu bất thư ờng khác

- Đau không giảm hoặc không thuyên giảm khi dùng thuốc kê toa • Da khô khó

chịu • Phát ban mới và/hoặc

ngứa hoặc phát ban không thuyên giảm khi dùng thuốc kê toa • Nếu bạn nghĩ mình có

thể đang mang thai

Cảnh báo sinh sản

- Cảnh báo khi mang thai: Thuốc này có thể gây tác hại cho thai nhi. phụ nữ của khả năng sinh sản nên sử dụng các phư ơng pháp ngừa thai hiệu quả trong quá trình điều trị ung thư và trong 3 tuần sau khi ngừng điều trị. Hãy cho bác sĩ biết ngay nếu bạn nghĩ mình có thể mang thai.
- Cảnh báo cho con bú: Phụ nữ không nên cho con bú trong thời gian điều trị và trong 6 ngày sau khi ngừng điều trị vì thuốc này có thể vào sữa mẹ và gây hại cho trẻ bú mẹ.
- Cảnh báo về khả năng sinh sản: Ở phụ nữ, thuốc này có thể ảnh hư ờng đến khả năng có con sau này. Nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá nếu bạn dự định có con. Hỏi thông tin về ngân hàng trứng.

Sửa đổi tháng 2 năm 2023

