

GIÁO DỤC BỆNH NHÂN & NGƯỜI CHĂM SÓC

Axit zoledronic

Thông tin này từ Lexicomp giải thích những điều bạn cần biết về loại thuốc này, bao gồm công dụng của thuốc, cách dùng, tác dụng phụ của thuốc và khi nào cần gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Tên thương hiệu: Mỹ

Phục hồi lại

Tên thương hiệu: Canada

Aclasta; Axit JAMP-Zoledronic; Axit TARO-Zoledronic; Axit Zoledronic - Z;
Zometa

Thuốc này dùng để làm gì?

- Nó được sử dụng để điều trị xương mềm, dễ gãy (loãng xương).
- Thuốc này không được phép sử dụng ở trẻ em. Tuy nhiên, bác sĩ có thể quyết định lợi ích của việc dùng thuốc này lớn hơn rủi ro. Nếu con bạn đã được cho dùng loại thuốc này, hãy hỏi bác sĩ để biết thông tin về lợi ích và rủi ro. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có thắc mắc về việc cho con bạn dùng thuốc này.

Sử dụng thuốc này trong quá trình điều trị ung thư :

- Nếu con bạn đã được sử dụng dạng thuốc này, hãy nói chuyện với bác sĩ để biết thông tin về lợi ích và rủi ro. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng về việc cho con bạn dùng thuốc này.

Tôi cần nói gì với bác sĩ TRƯỞNG KHI con tôi dùng thuốc này?

- Nếu con bạn bị dị ứng với thuốc này; bất kỳ phần nào của thuốc này; hoặc bất kỳ loại thuốc, thực phẩm hoặc chất nào khác. Hãy cho bác sĩ biết về tình trạng dị ứng và những dấu hiệu mà con bạn gặp phải.
- Nếu con bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào sau đây: Bệnh thận, nồng độ canxi thấp, hội chứng kém hấp thu hoặc tuyến cận giáp hoạt động kém.
- Nếu con bạn đã được phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật tuyến cận giáp hoặc cắt bỏ ruột non.
- Nếu con bạn đang dùng một loại thuốc khác có cùng loại thuốc.
- Nếu con bạn đang sử dụng một loại thuốc khác giống như loại thuốc này. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của con bạn.

Nếu con bạn đang mang thai hoặc đang cho con bú:

- Không dùng thuốc này cho con bạn trong khi mang thai.
- Hãy chắc chắn rằng con bạn không cho con bú trong khi dùng thuốc này.
Con bạn cũng có thể cần tránh cho con bú sữa mẹ một thời gian sau liều cuối cùng. Nói chuyện với bác sĩ của con bạn để xem liệu con bạn có cần tránh cho con bú sau liều cuối cùng hay không.

Đây không phải là danh sách tất cả các loại thuốc hoặc vấn đề sức khỏe tương tác với loại thuốc này.

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết về tất cả các loại thuốc của con bạn (theo toa hoặc OTC, sản phẩm tự nhiên, vitamin) và các vấn đề sức khỏe. Bạn phải kiểm tra để đảm bảo rằng việc sử dụng loại thuốc này cùng với tất cả các loại thuốc và vấn đề sức khỏe khác của con bạn là an toàn. Không bắt đầu, dừng hoặc thay đổi liều lượng của bất kỳ loại thuốc nào mà con bạn dùng mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

Một số điều tôi cần biết hoặc làm khi con tôi dùng thuốc này là gì?

- Nói với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn rằng con bạn đang dùng thuốc này. Điều này bao gồm các bác sĩ, y tá, dược sĩ và nha sĩ của con bạn.
- Bệnh hen suyễn trầm trọng hơn đã xảy ra ở những người dùng thuốc như thế này. Nói chuyện với bác sĩ.
- Thuốc này có thể làm tăng nguy cơ bị gãy chân. Nói chuyện với bác sĩ.
- Cho con bạn kiểm tra công thức máu và mật độ xương của con bạn như bạn đã được bác sĩ yêu cầu.
- Thuốc này hoạt động tốt nhất khi sử dụng cùng với canxi/vitamin D và các bài tập chịu trọng lượng như đi bộ hoặc PT (vật lý trị liệu).
- Cung cấp canxi và vitamin D như bác sĩ đã chỉ định cho con bạn.
- Thực hiện theo kế hoạch ăn kiêng và tập luyện mà bác sĩ đã chỉ định cho bạn.
- Thuốc này có thể gây ra các vấn đề về xương hàm. Nguy cơ có thể cao hơn khi sử dụng lâu hơn, bị ung thư, các vấn đề về răng miệng, răng giả không vừa khít, thiếu máu, các vấn đề về đông máu hoặc nhiễm trùng. Tỷ lệ này cũng có thể cao hơn nếu con bạn đi khám răng, hóa trị, xạ trị hoặc dùng các loại thuốc khác có thể gây ra các vấn đề về xương hàm. Nhiều loại thuốc có thể làm được điều này. Nói chuyện với bác sĩ của con bạn nếu bất kỳ điều nào trong số này áp dụng cho con bạn hoặc nếu bạn có thắc mắc. Hãy gọi cho bác sĩ của con bạn ngay nếu con bạn bị sưng hoặc đau hàm.
- Cho con bạn đi khám răng trước khi bắt đầu dùng thuốc này.
- Hãy chăm sóc răng của con bạn. Gặp nha sĩ thường xuyên.
- Bạn cần chắc chắn rằng con bạn không bị mất nước trước khi dùng thuốc này. Kiểm tra với bác sĩ để xem bạn có cần cho con uống thêm nước trước khi dùng thuốc này hay không.
- Thuốc này có thể gây ra vấn đề về khả năng sinh sản. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng có con. Nói chuyện với bác sĩ.

Một số tác dụng phụ mà tôi cần gọi cho bác sĩ của con tôi ngay là gì?

CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG: Mặc dù có thể hiếm gặp nhưng một số người có thể gặp các tác dụng phụ rất xấu và đôi khi gây tử vong khi dùng thuốc. Hãy cho bác sĩ của con bạn biết hoặc nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu con bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây có thể liên quan đến tác dụng phụ rất xấu:

- Dấu hiệu phản ứng dị ứng như phát ban; nổi mề đay; ngứa; da đỏ, sưng, phồng rộp hoặc bong tróc có hoặc không sốt; thở khò khè; tức ngực hoặc cổ họng; khó thở, nuốt hoặc nói chuyện; khàn giọng bất thường; hoặc sưng miệng, mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng.
- Các dấu hiệu của các vấn đề về chất lỏng và điện giải như thay đổi tâm trạng, lú lẫn, đau hoặc yếu cơ, nhịp tim nhanh hoặc bất thường, chóng mặt nghiêm trọng hoặc ngất xỉu, khát nước nhiều, co giật, cảm thấy rất mệt mỏi hoặc yếu đuối, chán ăn, không thể đi tiểu hoặc thay đổi trong cơ thể. lượng nước tiểu tiết ra, khô miệng, khô mắt hoặc đau bụng dữ dội hoặc nôn mửa.
- Các dấu hiệu của các vấn đề về thận như không thể đi tiểu, lượng nước tiểu thay đổi, tiểu ra máu hoặc tăng cân nhiều.
- Các dấu hiệu của huyết áp cao như nhức đầu hoặc chóng mặt rất nặng, bất tỉnh hoặc thay đổi thị lực.
- Bất kỳ cơn đau mới hoặc lạ nào ở háng, hông hoặc đùi.
- Hụt hơi.
- Cảm giác nóng rát, tê hoặc ngứa ran không bình thường.
- Đau ngực.
- Thay đổi thị lực, đau mắt hoặc kích ứng mắt nghiêm trọng.
- Khó nuốt.
- Đau rất nặng khi nuốt.
- Sưng ở cánh tay hoặc chân.

Một số tác dụng phụ khác của thuốc này là gì?

Tất cả các loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, nhiều người không có tác dụng phụ hoặc chỉ có tác dụng phụ nhẹ. Hãy gọi cho bác sĩ của con bạn hoặc nhận trợ giúp y tế nếu bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác làm phiền con bạn hoặc không biến mất:

- Cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi hoặc yếu đuối.
- Táo bón, tiêu chảy, đau dạ dày, khó chịu ở dạ dày hoặc nôn mửa.
- Ợ nóng.
- Đau đầu.
- Dấu hiệu giống cúm.
- Đau lưng, xương khớp, cơ hoặc cổ.
- Đau ở cánh tay hoặc chân.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có thắc mắc về tác dụng phụ, hãy gọi cho bác sĩ của con bạn. Gọi cho bác sĩ của con bạn để được tư vấn y tế về các tác dụng phụ.

Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho cơ quan y tế quốc gia của bạn.

Thuốc này được dùng tốt nhất như thế nào?

Cho thuốc này theo yêu cầu của bác sĩ của con bạn. Đọc tất cả thông tin được cung cấp cho bạn. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn chặt chẽ.

- Nó được tiêm dưới dạng tĩnh mạch trong một khoảng thời gian.
- Cho con bạn uống ít nhất 2 ly chất lỏng vài giờ trước khi dùng thuốc này.
- Cho con bạn uống nhiều chất lỏng không chứa caffeine trừ khi bác sĩ yêu cầu uống ít chất lỏng hơn.
- Acetaminophen có thể được dùng để hạ sốt và ổn lạnh.

Tôi phải làm gì nếu con tôi quên một liều thuốc?

- Hãy gọi cho bác sĩ của con bạn để biết phải làm gì.

Làm cách nào để bảo quản và/hoặc vứt bỏ loại thuốc này?

- Nếu bạn cần bảo quản thuốc này ở nhà, hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của con bạn về cách bảo quản thuốc.

Thông tin chung về thuốc

- Nếu các triệu chứng hoặc vấn đề sức khỏe của con bạn không thuyên giảm hoặc trở nên trầm trọng hơn, hãy gọi cho bác sĩ của con bạn.
- Không chia sẻ thuốc của con bạn với người khác và không đưa thuốc của người khác cho con bạn.
- Giữ tất cả các loại thuốc ở nơi an toàn. Giữ tất cả các loại thuốc xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Vứt bỏ thuốc không sử dụng hoặc hết hạn. Không xả xuống bồn cầu hoặc đổ xuống cống trừ khi bạn được yêu cầu làm như vậy. Hãy hỏi dược sĩ nếu bạn có thắc mắc về cách vứt bỏ thuốc tốt nhất. Có thể có các chương trình thu hồi ma túy trong khu vực của bạn.
- Một số loại thuốc có thể có tờ thông tin bệnh nhân khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về loại thuốc này, vui lòng nói chuyện với bác sĩ, y tá, dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của con bạn.
- Nếu bạn cho rằng đã xảy ra tình trạng quá liều, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc hoặc dược sĩ chăm sóc y tế ngay lập tức. Hãy sẵn sàng kể hoặc cho thấy những gì đã bị lấy đi, bao nhiêu và khi nó xảy ra.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và sử dụng thông tin người tiêu dùng

Thông tin tổng quát này là một bản tóm tắt hạn chế về thông tin chẩn đoán, điều trị và/hoặc thuốc. Nó không có nghĩa là toàn diện và nên được sử dụng như một công cụ giúp người dùng hiểu và/hoặc đánh giá các lựa chọn chẩn đoán và điều trị tiềm năng. Nó KHÔNG bao gồm tất cả thông tin về tình trạng, phương pháp điều trị, thuốc, tác dụng phụ hoặc rủi ro có thể áp dụng cho

một bệnh nhân cụ thể. Nó không nhằm mục đích tư vấn y tế hoặc thay thế cho lời khuyên y tế, chẩn đoán hoặc điều trị của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên việc kiểm tra và đánh giá của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về trữ ờng hợp cụ thể và riêng biệt của bệnh nhân. Bệnh nhân phải nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để biết thông tin đầy đủ về sức khỏe, các câu hỏi y tế và các lựa chọn điều trị của họ, bao gồm mọi rủi ro hoặc lợi ích liên quan đến việc sử dụng thuốc. Thông tin này không xác nhận bất kỳ phư ơng pháp điều trị hoặc thuốc nào là an toàn, hiệu quả hoặc đư ợc phê duyệt để điều trị cho một bệnh nhân cụ thể.

UpToDate, Inc. và các chi nhánh của nó từ chối mọi bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến thông tin này hoặc việc sử dụng thông tin đó. Việc sử dụng thông tin này đư ợc điều chỉnh bởi Điều khoản sử dụng, có sẵn tại <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-ectness-terms>.

Ngày đánh giá lần cuối

22-06-2023

Bản quyền © 2024

UpToDate, Inc. và các chi nhánh và/hoặc ngư ời cấp phép của nó. Đã đăng ký Bản quyền.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ trực tiếp với thành viên trong nhóm chăm sóc của bạn. Nếu bạn là bệnh nhân tại MSK và cần liên hệ với nhà cung cấp sau 5 giờ chiều, vào cuối tuần hoặc vào ngày lễ, hãy gọi 212-639-2000.

Để biết thêm tài nguyên, hãy truy cập www.mskcc.org/pe để tìm kiếm thư viện ảo của chúng tôi.

Axit Zoledronic - Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 12 năm 2022

Mọi quyền đư ợc sở hữu và bảo lưu bởi Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center