

<https://healthyungthu.com/shop/>

# ® Lười biếng

Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC)

Tập sách này dành cho những người đã được kê đơn LENVIMA để điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), một loại ung thư gan. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về điều trị LENVIMA.

## Nội dung

<a href="#">Giới thiệu về LENVIMA</a>	3
<a href="#">Liều lượng</a>	4
<a href="#">Đang sử dụng</a>	5
<a href="#">Phản ứng phụ</a>	6

Tập sách này nhằm mục đích hướng dẫn và không thay thế lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm thông tin.

<https://healthyungthu.com/shop/>

## LENVIMA là gì?

LENVIMA là thuốc chống ung thư có chứa hoạt chất lenvatinib. Nó thuộc về một nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế tyrosine kinase đa thụ thể.

## Khi nào LENVIMA được sử dụng?

LENVIMA được sử dụng để điều trị ung thư gan, còn được gọi là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), khi ung thư đã tiến triển và không thể phẫu thuật cắt bỏ.

## LENVIMA hoạt động như thế nào?

LENVIMA có thể hoạt động bằng cách làm chậm tốc độ phát triển của tế bào ung thư. Nó cũng có thể cắt đứt nguồn cung cấp máu giúp tế bào ung thư phát triển.

LENVIMA thực hiện điều này bằng cách ngăn chặn hoạt động của protein gọi là tyrosine kinase. Tyrosine kinase có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư cũng như sự phát triển của các mạch máu mới giúp ung thư phát triển.

## LENVIMA được dùng như thế nào?

LENVIMA có sẵn ở dạng viên nang mà bạn cần uống hàng ngày.

Dùng liều của bạn vào cùng một thời điểm mỗi ngày, có hoặc không có thức ăn.

Nuốt toàn bộ viên nang của bạn với một ly nước đầy. Không nhai, nghiền nát hoặc chia viên nang. Nếu bạn không thể nuốt toàn bộ viên nang, hãy đặt chúng vào ly với khoảng 25 mL nước hoặc nước táo. Không làm vỡ hoặc nghiền nát viên nang - để chúng tan rã trong ít nhất 10 phút và sau đó khuấy nhẹ chất lỏng trong ít nhất 3 phút để hòa tan vỏ viên nang. Nuốt hỗn dịch và sau đó thêm cùng một lượng nước hoặc nước táo vào ly.

Nhẹ nhàng xoay nó xung quanh và sau đó nuốt chất lỏng bổ sung này.

Không trộn nhiều loại thuốc vào ly cùng một lúc.

Điều quan trọng là phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào do bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn cung cấp, ngay cả khi những hướng dẫn này khác với thông tin được cung cấp trong tập sách này.

Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng LENVIMA.

## Liều lượng chính xác là gì?

LENVIMA thường được dùng dưới dạng 2 hoặc 3 viên nang có màu đỏ vàng.

Mỗi viên nang này chứa 4 mg thuốc (lenvatinib). Bác sĩ sẽ cho bạn biết cần uống bao nhiêu viên mỗi ngày.

## Liều khởi đầu

Nếu bạn nặng từ 60 kg trở lên		Nếu bạn nặng dưới 60 kg	
Liều uống	Số lượng viên nang 4 mg	Liều uống	Số viên nang 4 mg
12 mg Một lần mỗi ngày		8 mg Một lần mỗi ngày	

Xin lưu ý rằng bác sĩ có thể đã kê đơn thuốc khác hoặc có thể giảm liều nếu bạn gặp tác dụng phụ. Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn về liều lượng chính xác cho mình.

## Việc điều trị sẽ kéo dài bao lâu?

Việc điều trị LENVIMA có thể tiếp tục miễn là nó có lợi cho bạn.

Bác sĩ sẽ theo dõi việc điều trị của bạn và đưa ra lời khuyên dựa trên sở thích cá nhân và phản ứng của bạn với LENVIMA, bao gồm mọi tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải.

Đừng ngừng dùng LENVIMA hoặc thay đổi liều trừ khi bác sĩ khuyên bạn làm như vậy.

## Nếu tôi quên uống LENVIMA thì sao?

Nếu bạn quên liều LENVIMA, bạn sẽ cần cân nhắc khi nào đến liều tiếp theo.

- Nếu liều tiếp theo của bạn sẽ đến sau 12 giờ hoặc hơn, hãy dùng liều đã quên ngay khi nhớ ra. Sau đó dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường.
- Nếu liều tiếp theo của bạn sắp hết trong vòng chưa đầy 12 giờ, hãy bỏ qua liều đã quên. Sau đó dùng liều tiếp theo vào thời gian bình thường.

Không dùng hai liều cùng một lúc để bù cho liều đã quên. Điều này có thể làm tăng nguy cơ gặp phải tác dụng phụ.

## Tôi có gặp tác dụng phụ khi sử dụng LENVIMA không?

Giống như tất cả các loại thuốc chống ung thư, LENVIMA có thể gây ra một số tác dụng phụ - tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân đều gặp phải tác dụng phụ và một số bệnh nhân có thể gặp rất ít tác dụng phụ.

Hầu hết các tác dụng phụ của LENVIMA sẽ ở mức độ nhẹ đến trung bình và có thể kiểm soát được, nhưng một số có thể cần được chăm sóc y tế, vì vậy điều quan trọng là phải báo cáo bất kỳ triệu chứng mới nào cho bác sĩ của bạn.

Đừng cố gắng tự mình xử lý các tác dụng phụ.

Tùy thuộc vào tác dụng phụ, bác sĩ có thể cần điều chỉnh liều, trì hoãn hoặc ngừng điều trị LENVIMA. Bác sĩ của bạn cũng có thể đưa ra lời khuyên về cách quản lý các tác dụng phụ tại nhà.

## Những tác dụng phụ thường gặp nhất của LENVIMA là gì?

Mọi người sẽ phản ứng với điều trị LENVIMA khác nhau. Tuy nhiên, các tác dụng phụ phổ biến nhất được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng bao gồm:

- ▶ Huyết áp cao hay thấp
- ▶ Chán ăn hoặc sụt cân
- ▶ Cảm giác khó chịu và ốm yếu, táo bón, tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu
- ▶ Cảm thấy buồn ngủ (buồn ngủ hoặc buồn ngủ)
- ▶ Cảm thấy yếu đuối
- ▶ Ho hoặc khàn giọng
- ▶ Sưng chân
- ▶ Phát ban
- ▶ Miệng khô, đau hoặc viêm, cảm giác vị giác kỳ lạ
- ▶ Sưng và viêm khớp, cứng cơ, xương và khớp
- ▶ Cảm thấy chóng mặt
- ▶ Rụng tóc
- ▶ Chảy máu (thường gặp nhất là chảy máu mũi, nhưng có thể bao gồm chảy máu từ các vị trí khác như máu trong nước tiểu, bầm tím, chảy máu nướu hoặc thành ruột)
- ▶ Khó ngủ
- ▶ Tăng protein trong nước tiểu
- ▶ Nhiễm trùng tiết niệu (tăng tần suất đi tiểu và đi tiểu khó khăn hoặc đau đớn)
- ▶ Đau - cơ, khớp, nhức đầu, lưng
- ▶ Đỏ, đau nhức và sưng da ở tay và chân (hội chứng tay chân)
- ▶ Tuyến giáp hoạt động kém (mệt mỏi, tăng cân, táo bón, cảm giác lạnh, khô da)
- ▶ Nồng độ natri, kali và canxi trong xét nghiệm máu thấp

- ▶ Nồng độ cholesterol và hormone kích thích tuyến giáp cao trong xét nghiệm máu
- ▶ Giảm số lượng tế bào bạch cầu
- ▶ Vết bầm tím và khó lành vết thương - dấu hiệu của lượng tiểu cầu trong máu thấp.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ, bao gồm bất kỳ triệu chứng nào không được liệt kê ở trên, hãy liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt.

## Tôi nên biết gì về huyết áp cao?

Huyết áp cao (hoặc tăng huyết áp) là tác dụng phụ rất phổ biến của LENVIMA. Chỉ dưới một nửa số người đang dùng LENVIMA để điều trị HCC sẽ bị tăng huyết áp.

## Có thể làm gì khi bị huyết áp cao?

Huyết áp cao cần được điều trị. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc hạ huyết áp cho bạn hoặc thay đổi liều lượng thuốc hạ huyết áp hiện tại để giảm huyết áp. Huyết áp cao không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, vì vậy điều quan trọng là phải dùng thuốc này theo chỉ dẫn của bác sĩ.

## Nếu tôi bị huyết áp cao trước khi bắt đầu LENVIMA thì sao?

Nếu bạn đã bị huyết áp cao, bác sĩ sẽ cho bạn liệu pháp hạ huyết áp trước khi bạn bắt đầu LENVIMA để đưa huyết áp của bạn về mức bình thường.

Trong quá trình điều trị, huyết áp của bạn sẽ được theo dõi chặt chẽ và bác sĩ sẽ điều chỉnh thuốc hạ huyết áp nếu cần thiết.

## Tôi có cần tự đo huyết áp không?

Bác sĩ có thể khuyên bạn nên thường xuyên theo dõi huyết áp và có thể yêu cầu bạn thực hiện việc này tại nhà hoặc đến gặp bác sĩ hoặc hiệu thuốc địa phương để đo.

## Tôi nên biết gì về sự mệt mỏi?

Mệt mỏi là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của việc điều trị ung thư và chính bệnh ung thư. Nguyên nhân của nó chưa được hiểu rõ. Nếu bạn trở nên mệt mỏi, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc kiệt sức trong hầu hết thời gian. Bạn cũng có thể thấy rằng giấc ngủ không làm bạn tỉnh táo như bình thường.

### Tình trạng mệt mỏi phổ biến như thế nào khi sử dụng LENVIMA?

Chỉ dưới một nửa số người đang dùng LENVIMA để điều trị HCC sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nói chung LENVIMA gây mệt mỏi từ nhẹ đến trung bình, nhưng điều quan trọng là bạn phải nói chuyện với bác sĩ về những cách bạn có thể thử và kiểm soát tình trạng này.

### Có thể làm gì cho đỡ mệt?

Nói chuyện với bác sĩ và y tá nếu bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu tình trạng mệt mỏi của bạn có nguyên nhân cơ bản như thiếu máu hoặc đau đớn, có thể có các phương pháp điều trị hữu ích.

Ngoài ra còn có những điều bạn có thể làm để giúp đỡ:

- Ăn các bữa chính và bữa ăn nhẹ đều đặn để có năng lượng và uống đủ nước
- Dành một chút thời gian mỗi ngày để thư giãn hoặc thiền định
- Nếu bạn có đủ năng lượng, hãy tập vài bài tập nhẹ nhàng mỗi ngày
- Ưu tiên một số hoạt động nhất định vì bạn có thể không đạt được nhiều thành tích mỗi ngày như mong muốn
- Chấp nhận sự giúp đỡ từ gia đình, người chăm sóc, bạn bè hoặc đồng nghiệp
- Tổ chức ngày của bạn để bao gồm thời gian nghỉ ngơi.

## Tôi nên biết gì về bệnh tiêu chảy?

Tiêu chảy có thể là tình trạng đi tiêu phân lỏng và chảy nước hoặc tăng số lần đi tiêu. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn bị tiêu chảy trong khi điều trị.

### Tiêu chảy phổ biến như thế nào với LENVIMA?

Khoảng 2 trong 5 bệnh nhân được điều trị HCC bằng LENVIMA sẽ bị tiêu chảy. Tình trạng này chủ yếu ở mức độ nhẹ đến trung bình và có thể được bác sĩ kiểm soát.

### Tôi nên làm gì nếu bị tiêu chảy?

Tiêu chảy cần được điều trị. Nó thường có thể được kiểm soát bằng chất lỏng và thuốc chống tiêu chảy do bác sĩ kê toa.

Nếu tình trạng tiêu chảy của bạn không được kiểm soát ngay cả sau khi dùng thuốc chống tiêu chảy, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc y tá để được tư vấn.

### Tôi có thể làm gì để giảm tiêu chảy?

Những lời khuyên ăn uống sau đây có thể giúp giảm tiêu chảy:

- Ăn tối đa sáu bữa nhỏ mỗi ngày
- Tránh đồ uống có chứa caffein, rượu và nước ép trái cây có nồng độ cao
- Tránh sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa không chứa lactose có thể được)
- Hạn chế thực phẩm khiến bệnh tiêu chảy nặng hơn, bao gồm thực phẩm béo hoặc chiên, thức ăn cay, rau sống, trái cây sống và thực phẩm giàu chất xơ như cám, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại đậu
- Ăn các bữa ăn ít chất xơ bao gồm những thứ như bánh mì trắng, cơm, mì ống, thịt gà hoặc cá không da
- Ăn trái cây và rau quả gọt vỏ và nấu chín hoặc trái cây đóng hộp hoặc hầm.

## Tôi nên biết gì về buồn nôn và nôn?

Khoảng 1 trong 5 bệnh nhân được điều trị bằng LENVIMA để điều trị HCC sẽ bị buồn nôn và ít hơn một chút sẽ bị nôn. Hầu hết đây là tác dụng phụ nhẹ đến trung bình và có thể dễ dàng điều trị.

### Có thể làm gì khi buồn nôn và nôn?

Bác sĩ có thể cung cấp cho bạn thuốc chống ốm đau trong quá trình điều trị. Chúng còn được gọi là 'thuốc chống nôn'. Có một số loại thuốc chống bệnh tật khác nhau có sẵn.

Nếu bạn được kê đơn những loại thuốc này, điều quan trọng là phải dùng chúng theo chỉ dẫn của bác sĩ ngay cả khi bạn không cảm thấy ốm vào thời điểm đó.

Những gì bạn ăn và uống cũng có thể làm giảm buồn nôn và nôn nữa hoặc có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn. Y tá ung thư hoặc bác sĩ dinh dưỡng của bạn có thể đưa ra lời khuyên về việc ăn uống để tránh buồn nôn.

### Tôi nên làm gì nếu cảm giác buồn nôn không biến mất?

Nếu bạn bị buồn nôn kéo dài hơn hai ngày hoặc khiến bạn không thể làm những việc quan trọng và thú vị, hãy báo cho bác sĩ hoặc y tá của bạn. Thuốc chống ốm đau của bạn có thể cần phải thay đổi hoặc tăng liều lượng.

## Tôi nên biết gì về việc giảm cảm giác thèm ăn và giảm cân?

Mọi người thường giảm cân trong quá trình điều trị ung thư. Điều này có thể là do việc điều trị ung thư làm giảm sự thèm ăn của bạn hoặc có thể là do chính bệnh ung thư.

### Mức độ giảm cân phổ biến với LENVIMA như thế nào?

Khoảng 1 trong 3 người được điều trị HCC bằng LENVIMA sẽ bị giảm cân trong quá trình điều trị.

### Làm thế nào tôi có thể cải thiện sự thèm ăn của mình?

Thay đổi khẩu vị có thể khiến bạn mất cảm giác ngon miệng. Cải thiện hương vị của thực phẩm có thể giúp kích thích sự thèm ăn của bạn.

- Nếu thức ăn quá ngọt có thể thêm muối, nước cốt chanh hoặc bột cà phê; nếu thức ăn có vị kim loại hoặc mặn, hãy thêm đường hoặc mật ong
- Thêm gia vị, tỏi, rau thơm, phô mai hoặc thịt xông khói để tăng hương vị
- Sử dụng ống hút để bỏ qua vị giác của bạn.

Nếu bạn có thể ăn nhưng cảm thấy no ngay sau khi ăn, bạn nên ăn nhiều bữa nhỏ hoặc ăn vặt thường xuyên thay vì ăn nhiều bữa.

Bụng đói có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn, vì vậy hãy nhớ ăn nhẹ thường xuyên.

## Tôi nên biết gì về đau bụng?

Một số người bị đau bụng trong quá trình điều trị ung thư. Đau bụng có thể xảy ra do điều trị hoặc do chính bệnh ung thư.

Kiểm soát cơn đau có thể cho phép bạn quay trở lại nhiều hoạt động mà bạn yêu thích.

### Đau bụng phổ biến như thế nào khi dùng LENVIMA?

Gần 1 trong 5 người (17%) được điều trị HCC bằng LENVIMA sẽ bị đau bụng. Đây là tình trạng nhẹ và có thể kiểm soát được đối với hầu hết mọi người.

### Có thể làm gì khi bị đau bụng?

Cơn đau có thể được kiểm soát bằng cách dùng thuốc. Thuốc giảm đau được gọi là thuốc giảm đau và có nhiều loại khác nhau có thể điều trị các mức độ đau khác nhau. Cơn đau nhẹ có thể được điều trị bằng acetaminophen hoặc thuốc chống viêm không steroid. Cơn đau vừa phải có thể được điều trị bằng thuốc opioid nhẹ như codeine. Cơn đau mạnh có thể được điều trị bằng thuốc opioid mạnh hơn.

Dùng thuốc giảm đau thường xuyên có thể giúp bạn kiểm soát được cơn đau và điều đó có nghĩa là bạn cần dùng liều thấp hơn so với việc đợi cho đến khi cơn đau trầm trọng rồi mới dùng thuốc.

Nếu thuốc giảm đau làm bạn buồn ngủ hoặc gây ra các tác dụng phụ khác, hãy nói chuyện với bác sĩ vì có thể cần phải điều chỉnh liều lượng của bạn.

### Có phương pháp thay thế nào để giảm đau không?

Không phải ai cũng cần dùng thuốc giảm đau để giảm đau. Đối với một số người, chuyển động như đi bộ và giãn cơ có thể làm giảm đau.

Nhà vật lý trị liệu hoặc nhà sinh lý học thể dục có thể thiết kế một chương trình giúp bạn vận động. Các kỹ thuật thư giãn như chánh niệm và thiền định, chườm nóng hoặc lạnh hoặc mát-xa thư giãn cũng có thể hữu ích.

Nói chuyện với bác sĩ về những gì bạn đang làm để giảm đau, vì một số liệu pháp bổ sung có thể không được khuyến khích với một số phương pháp điều trị.

## Tôi nên biết gì về hội chứng tay chân?

Hội chứng tay-chân còn được gọi là rối loạn cảm giác do lòng bàn tay-bàn chân (PPE). Đó là một tác dụng phụ thường gặp của nhiều liệu pháp điều trị ung thư, ảnh hưởng đến lòng bàn tay và/hoặc lòng bàn chân của bạn.

Các triệu chứng bao gồm:

- Da đỏ, viêm
- Dị dạng
- Nổi đau
- Súng tấy
- Ngứa ran, ghim và kim
- Tê
- Ngứa
- Rộp
- Phát ban khô
- Da khô nứt
- Vết loét
- Suy giảm cảm giác.

### Hội chứng tay chân với LENVIMA phổ biến như thế nào?

Khoảng 1 trong 4 người được điều trị HCC bằng LENVIMA sẽ phát triển hội chứng tay chân. Các triệu chứng ở mức độ nhẹ đến trung bình đối với hầu hết mọi người - chỉ 5% số người mắc hội chứng tay chân khi sử dụng LENVIMA cần phải ngừng hoặc giảm liều.

### Có thể làm gì với hội chứng tay chân?

Các triệu chứng của hội chứng tay chân có thể được điều trị bằng cách sử dụng kem bôi lên vết thương, chườm lạnh, kem dưỡng ẩm, thuốc bôi gọi là corticosteroid và thuốc giảm đau.

## Tôi nên biết gì về các sự kiện chảy máu?

Chảy máu trong quá trình điều trị ung thư xảy ra do việc điều trị làm giảm số lượng tiểu cầu trong máu của bạn. Tiểu cầu có liên quan đến quá trình đông máu. Khi không có đủ tiểu cầu để tạo thành cục máu đông, bạn có thể bị chảy máu.

### Chảy máu phổ biến như thế nào với LENVIMA?

Khoảng 1 trong 5 người dùng LENVIMA để điều trị HCC sẽ bị chảy máu, phần lớn các trường hợp ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và có thể kiểm soát được.

### Chảy máu xảy ra ở đâu?

Nơi phổ biến nhất mà những người đang điều trị ung thư gặp phải tình trạng chảy máu là qua mũi. Chảy máu cũng có thể xảy ra ở các vị trí khác, chẳng hạn như máu trong nước tiểu, vết bầm tím, chảy máu nướu hoặc thành ruột.

### Chảy máu được điều trị như thế nào?

Bác sĩ sẽ theo dõi mức tiểu cầu của bạn bằng cách làm xét nghiệm máu. Nếu mức tiểu cầu của bạn xuống rất thấp, bạn có thể cần phải truyền tiểu cầu.

Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ có thể ngừng LENVIMA trong một thời gian ngắn trước khi thực hiện thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật.

## Tôi nên biết gì về việc phát triển giọng khàn?

Khàn giọng (khó phát âm) là tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị ung thư. Bạn có thể có giọng nói khác, căng thẳng khi nói hoặc trong một số trường hợp rất hiếm là mất giọng hoàn toàn (khoảng 1% số người).

### Chứng khó phát âm phổ biến như thế nào với LENVIMA?

Khoảng 1 trong 4 người dùng LENVIMA để điều trị HCC sẽ bị khàn giọng và trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này ở mức độ nhẹ đến trung bình.

### Làm cách nào tôi có thể quản lý những thay đổi đối với giọng nói của mình?

Nếu bạn gặp khó khăn khi nói chuyện, đôi khi bạn cảm thấy đau khổ, thất vọng hoặc tức giận là điều tự nhiên. Có thể phải mất thời gian và luyện tập để lấy lại giọng nói và bạn có thể thấy rằng mình cần phải lặp lại nếu giọng rất khàn. Trong nhiều trường hợp, khàn giọng có thể tự khỏi. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia để gọi điện thoại.

### Địa chỉ liên hệ điều trị LENVIMA

Sử dụng trang này để ghi lại tên và số điện thoại của trung tâm điều trị và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Khoa bệnh viện: \_\_\_\_\_

Bác sĩ chuyên khoa gan: \_\_\_\_\_

Y tá chuyên khoa: \_\_\_\_\_

Liên hệ khẩn cấp ngoài giờ: \_\_\_\_\_

Chuyên môn về nội khoa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### LƯU Ý

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



<https://healthyngthu.com/shop/>



LENVIMA® là nhãn hiệu đã đăng ký của Eisai Australia Pty Ltd PO  
Box 33004, Melbourne VIC 3004. ABN 73 117 970 993.

Liên hệ với Thông tin Y tế Eisai Australia

theo số 03 9832 9100 hoặc [medinfo\\_australia@eisai.net](mailto:medinfo_australia@eisai.net).

Ngày chuẩn bị: Tháng 3 năm 2019.

AU-LENA-19-00019

