

CÁC DỮ KIẾN QUAN TRỌNG

Đây chỉ là bản tóm tắt ngắn gọn về thông tin quan trọng về VEMLIDY. Thông tin này không thay cho việc nói chuyện với bác sĩ của quý vị về chứng bệnh cũng như việc điều trị của quý vị.

(VEM-lih-dee)

THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT VỀ VEMLIDY

VEMLIDY có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó bao gồm:

- **Chứng viêm gan B trầm trọng hơn.** Chứng viêm gan B (HBV) của quý vị có thể bỗng nhiên trở nên trầm trọng hơn (đột tiến triển cấp nặng) nếu quý vị ngừng dùng VEMLIDY. Đừng để hết thuốc VEMLIDY. Đừng ngừng dùng VEMLIDY khi chưa nói chuyện trước với bác sĩ của quý vị, vì họ sẽ cần kiểm tra sức khỏe của quý vị thường xuyên sau khi ngừng trị liệu.

VỀ VEMLIDY

VEMLIDY là một loại thuốc theo toa, dùng để điều trị siêu vi viêm gan B (HBV) mãn tính (lâu dài) ở những người lớn mắc bệnh gan ổn định (còn bù).

VEMLIDY:

- Có thể làm giảm lượng HBV trong cơ thể của quý vị.
- Có thể cải thiện tình trạng lá gan của quý vị.

TRƯỚC KHI DÙNG VEMLIDY

Cho bác sĩ của quý vị biết toàn bộ các bệnh trạng của quý vị, kể cả trường hợp nếu quý vị:

- Nhiễm HIV-1. Bác sĩ của quý vị có thể làm xét nghiệm kiểm tra tình trạng nhiễm HIV đối với quý vị trước khi quý vị bắt đầu dùng VEMLIDY. Nếu quý vị có cả HBV và HIV, và chỉ dùng VEMLIDY, siêu vi HIV có thể trở nên kháng thuốc và khó điều trị hơn.
- Có bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD).
- Đang mang thai hoặc dự định có thai.
- Đang cho con bú sữa mẹ hoặc dự định cho con bú sữa mẹ.

Cho bác sĩ của quý vị biết về tất cả các loại thuốc quý vị đang dùng:

- Giữ một danh sách tất cả các loại thuốc kê toa và thuốc mua không cần toa, sinh tố, thuốc bổ thảo dược, và cho dược sĩ và bác sĩ của quý vị xem.
- Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị về các loại thuốc tương tác với VEMLIDY.

CÁC PHẢN ỨNG PHỤ CÓ THỂ GẶP CỦA VEMLIDY

VEMLIDY có thể gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó bao gồm:

- Các phản ứng phụ trong mục "Thông Tin Quan Trọng Nhất Về VEMLIDY".
- Các vấn đề về thận mới xuất hiện hoặc trầm trọng hơn, bao gồm cả suy thận. Bác sĩ của quý vị có thể làm các xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra thận của quý vị khi quý vị bắt đầu và trong khi quý vị điều trị bằng Vemlidy.
- Quá nhiều a-xít lactic trong máu (nhiễm a-xít lactic), là trường hợp cấp cứu y khoa nghiêm trọng nhưng hiếm gặp, có thể gây tử vong. Cho bác sĩ của quý vị biết ngay nếu quý vị có các triệu chứng sau đây: suy nhược hoặc mệt mỏi hơn bình thường, đau cơ bất thường, thở dốc hoặc thở nhanh, đau bụng cùng với triệu chứng buồn nôn và ói mửa, bàn tay và bàn chân lạnh hoặc tái xám, cảm giác chóng mặt hoặc đau đầu, hoặc nhịp tim đập nhanh hoặc bất thường.
- Các vấn đề rất nghiêm trọng về gan, trong những trường hợp hiếm gặp có thể gây tử vong. Cho bác sĩ của quý vị biết ngay nếu quý vị gặp các triệu chứng sau đây: da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng, nước tiểu sậm màu "như màu nước trà", phân nhạt màu, chán ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn, buồn nôn, hoặc đau vùng bao tử.

Phản ứng phụ thường gặp nhất của VEMLIDY là đau đầu.

Đây không phải là tất cả các phản ứng phụ có thể gặp khi dùng VEMLIDY. Cho bác sĩ của quý vị biết ngay nếu quý vị có bất kỳ phản ứng phụ nào gây phiền toái cho quý vị hoặc không hết.

CÁCH DÙNG VEMLIDY

Dùng VEMLIDY mỗi ngày 1 lần cùng với thức ăn.

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

- Đây chỉ là bản tóm tắt ngắn gọn về thông tin quan trọng về VEMLIDY. Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị để tìm hiểu thêm.
- Tới website VEMLIDY.com hoặc gọi số 1-800-GILEAD-5.
- Nếu quý vị cần giúp chi trả cho thuốc men của quý vị, tới website VEMLIDY.com để biết thông tin về các chương trình.