



THUỐC KHÁNG VIÊM GAN C

**ZEPATIER®**

(Elbasvir/Grazoprevir)

Viên nén 50/100 mg

**Thuốc này hoạt động như thế nào?**

Zepatier® là sự kết hợp của hai loại thuốc elbasvir và grazoprevir, được chỉ định để điều trị nhiễm virus viêm gan C (HCV).

Zepatier® chặn một số giai đoạn của quá trình nhân lên của virus. Điều này ngăn chặn virus nhân lên để thúc đẩy quá trình chữa lành.

**Làm thế nào để dùng thuốc này?**

Zepatier® → 1 viên mỗi ngày một lần .

Thuốc này phải được dùng cùng với thức ăn.

Điều quan trọng là phải dùng Zepatier® thường xuyên, vào cùng một thời điểm mỗi ngày trong suốt thời gian điều trị. Nếu bạn bỏ lỡ liều, nó có thể ảnh hưởng đến sự thành công của việc điều trị và giảm cơ hội phục hồi của bạn. Hơn nữa, vi-rút gây bệnh viêm gan của bạn có thể trở nên kháng thuốc và làm cho thuốc kém hiệu quả hơn hoặc thậm chí vô dụng.

Thời gian điều trị có thể thay đổi từ 8, 12 đến 16 tuần tùy thuộc vào:

- Loại vi-rút
- Tình trạng gan của bạn
- Đáp ứng với điều trị trước đó
- Tình trạng thận của bạn

**Tôi có thể dùng Zepatier® cùng với các loại thuốc khác không?**

Hãy nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn đặc biệt nếu bạn thực hiện những điều sau:

- Thuốc chống thải ghép như cyclosporine (Neoral)
- Thuốc điều trị nhiễm nấm như keto-thuốc bôi

- Thuốc điều trị bệnh lao  
rifampin (Rifater, Rifadin, Rofact), rifabutin (My-cobutin) hoặc rifapentine
- Thuốc chống động kinh như carbamazepine (Tegretol), oxcarbazepine (Trileptal), phenobarbital (Phenobarb), hoặc phenytoine (Dilantin)
- Thuốc điều trị tăng áp động mạch phổi như bosentan (Tracleer)
- Thuốc giúp tỉnh táo như modafinil (Alertec)
- Thuốc điều trị HIV như atazanavir (Reya-taz), darunavir (Prezista, Prezcofix), ritonavir (Norvir), lopinavir (Kaletra), tipranavir (Aptivus), efavirenz (Sustiva, Atripla), etravirine (Inte-lence), elvitégraver/cobicistat (Stribild, Genvoya)
- Sản phẩm tự nhiên: St. John's Wort (*Hypericum perforatum*)

Những loại thuốc này chống chỉ định hoặc nên tránh sử dụng Zepatier®. Bác sĩ sẽ đề xuất một giải pháp thay thế hoặc điều chỉnh liều lượng với sự theo dõi chặt chẽ hơn.

Các loại thuốc khác cũng có thể tương tác với Zepatier®, bạn nên nói với bác sĩ về tất cả các sản phẩm y tế bạn dùng.

Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc theo toa mới, thuốc không kê đơn, sản phẩm tự nhiên hoặc thậm chí là thuốc giải trí.

**Tôi có thể uống rượu với Zepatier® không?**

Tốt nhất, người nhiễm HCV nên kiêng rượu (bia, rượu vang và rượu mạnh) để bảo vệ gan.

### Tác dụng phụ của thuốc này là gì?

Nói chung đây là một loại thuốc được dung nạp tốt, các tác dụng phụ chính được quan sát thấy của Zepatier® là nhẹ và không cần phải ngừng điều trị.

Chúng bao gồm những thứ khác:

- Đau đầu
- Mệt mỏi
- Buồn nôn

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết về bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc kéo dài. Họ có thể khuyên bạn quản lý chúng.

Không bao giờ ngừng điều trị mà không nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ trước.

### Mang thai và cho con bú

Tác dụng của elbasvir và grazoprevir chưa được biết ở phụ nữ mang thai. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên sử dụng biện pháp tránh thai thích hợp.

Hãy thảo luận điều này với bác sĩ của bạn.

Sự hiện diện của elbasvir và grazoprevir và các chất chuyển hóa của chúng trong sữa mẹ vẫn chưa được biết rõ.

Do đó, việc cho con bú không được khuyến khích trong quá trình điều trị bằng Zepatier®.

### Kho

Bảo quản viên Zepatier® ở nơi khô ráo, ở nhiệt độ phòng (15 đến 30° C hoặc 59 đến 86° F). Tránh những nơi ẩm ướt như phòng tắm.

Giữ thuốc này trong hộp đựng ban đầu của nó. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

### Lời khuyên chung


Hãy trung thành với các cuộc hẹn với bác sĩ và nhóm điều trị; họ sẽ có thể theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuốc của mình hoặc cần trợ giúp để sắp xếp thời điểm dùng thuốc, đừng ngần ngại hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ, những người quen thuộc với những gì bạn đang dùng.

Người liên hệ: \_\_\_\_\_

Điện thoại : \_\_\_\_\_

### Tôi quên uống một liều!



Đừng tăng gấp đôi liều lượng